

slovenka

PREVENCIA POD DOHĽADOM ODBORNÍKOV

ZDRAVIE RODINY

8/9/2020, 1,70 €

**RIEŠIME
CHRONICKÚ
BOLEST**

HLAVY, CHRBTICE,
ŽALÚDKA, PANVY



**DOVOLENKOVÉ
ÚRAZY
PRVÁ POMOC
V PRAXI**

**KEď NECHTY
ZARASTAJÚ**

**GYNEKOLOGICKÉ
ZÁPALY V LETE**



9 771539767001 08

VYHRAJTE
RELAXAČNÝ POBYT
V RESIDENCE
HOTEL & CLUB ****
DONOVALY

**EXKLUZÍVNE
REŠTART PO
KARANTÉNE
ČO STE NESTIHLI
PRED LETOM**

**PRÍRODNÝ
BOTOX BEZ
VEDĽAJŠÍCH
ÚCINKOV**

**PETRA
POLNIŠOVÁ**

**NEBERIEM SA
PRÍLIŠ VÁŽNE**



GYNEKOLOGIC

KTORÉ Z NICH MÔŽU REÁLNE PRERÁŠŤ V NEPLODNOSŤ?

PRE NIEKTORÉ ŽENY MÔŽE LETO PREDSTAVOVAŤ NAJKRAJŠIE OBDOBIE V ROKU, PRE INÉ HOTOVÚ NOČNÚ MORU. AK V INTÍMNYCH PARTIÁCH VZNIKNE PROBLÉM A NEPODCHYTÍ SA SPRÁVNE UŽ V JEHO ZAČIATKU, MÔŽE PRERÁŠŤ V NEPRÍJEMNÝ KOLOTOČ, KTORÝ V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽE VIESŤ AŽ K NEPLODNOSTI.



MUDR.
SILVESTER
GALO, PhD.,
gynekológ

neraz dozvedáme, takto ich dokážeme podchytíť.

Čoraz častejšie sa hovorí o komplikáciach pri otehotnení žien, ktoré mohli zapríčiniť opakované a neriešené zápaly. Môžu byť pre ženu a jej plodnosť naozaj hrozobu?

Nie všetky gynekologické zápaly sú priamou príčinou infertility. Najlepšie bude, ak si rozanalizujeme najčastejšie z nich a k nim si vysvetlime aj ich vzťah k plodnosti.

1. Tak napríklad chlamydia trachomatis sú baktérie, ktoré parazitujú vo vnútri vnímaných buniek sliznic. Majú dvojfázový životný cyklus, ktorý sa odohráva mimo aj vnútri bunky. Chlamydia trachomatis je najčastejšie ochorenie prenášané pohlavným stykom, ktoré, ak sa nelieči, môže spôsobiť vázne poškodenie vajcovodov v zmysle ich čiasťočného alebo úplného uzavretia zápalovými zmenami. V extrémnom prípade môže spôsobiť zápalové ochorenie malej panvy s vážnymi následkami.


2. Ďalej bakteriálna vaginóza, známa aj ako vaginálna bakterioza, je vyvolávaná baktériou Gardnerella vaginalis. Je to zápalové ochorenie pošvy zapríčinené premnožením Gardnerelly, ale aj iných baktérii, ktoré ju typicky sprevádzajú. Medzi typické symptómy patrí hojný belavý výtok, sprevádzaný zápaciami „rybaciny“. Môže sa prejavíť aj pálením pri močení, eventualne sa nemusí prejavovať vôbec. Zvyšuje riziko nákazy sexuálne prenosnými chorobami vrátane

Leto prináša určitý telesný diskomfort, vyššie teploty, častejšie potenie sa, kúpanie v bazénoch, v jazerach, častejšie návštavy cudzích sociálnych zariadení, hotelov a spŕch, skrátka, leto predstavuje pre náhľynejšie ženy previerku imunity aj tam dolu.

Ako správne postupovať pri gynekologických zápaloch nielen v lete a ako zabrániť ich najhoršiemu dôsledku, sme sa poradili s MUDr. Silvestrom Galom, PhD., vedúcim lekárom centra gynekológie, urologie a asistovanej reprodukcie v Žiline.

Pán doktor, aká je vaša skúsenosť, je zápalov v porovnaní s ich výskytom v minulosti viac? Alebo tu boli vždy, len sa o nich tolko nehovorio?

Zápalys vo všeobecnosti nepribúdajú, skôr je častejšia diagnostika baktérií, ktoré sa v pošve súčasťou nachádzajú, ale nespôsobujú klinické prejavy ako svrbenie, bolest a výtok. Sú diagnostikované až v rámci preventívnych prehliadok, ale aj ako súčasť vstupných výšetrení napríklad v IVF centrach. Takto sa o nich



KÉ ZÁPALY

HIV/AIDS a tiež zvyšuje riziko predčasného pôrodu. Najnovšie štúdie mikrobiomu, čiže kompletného mikrobiálneho osídlenia pošvy u pacientiek s reprodukčnými poruchami, poukazujú na možný vplyv Gardnerelly vaginalis ako faktora znížujúceho úspešnosť liečby metódami IVF.

3. Potom sú tu ešte ureaplasmy a mykoplasmy, ktoré modifikujú imunologickú odpovied, spôsobujú chronické zápalové zmeny a môžu viesť k stavu „nabudenia“ imunity, ktorého dôsledkom môže byť zniženie šancí na správne uchytanie embrya.

Pri akých príznakoch by teda mali ženy zbystríť pozornosť?

Svrbenie, pálenie, výtok, zápach, pobolievanie podbruška a bolesť pri pohlavnom styku, to všetko sú príznaky, pri ktorých je nutné vyhľadať gynekologa. Niektoré nezávažné, počinajúce zápaly sice dokáže eliminovať prirodzená imunita, ale v prípade rozvinutého zápalu s výšie uvedenými prejavmi je potrebné vyhľadať lekára. Je nesmierne dôležité zachytiť a preliečiť zápal v jeho počiatocnom štádiu, aby nezanechal následky.

Zo zvedavosti som preskúmala tému gynekologických zápalov na oblúbenom mamičkovskom diskusnom fóre. Zdá sa, že mnohé ženy majú vo zvyku po spozorovaní fažkostí zájsť prv po liečivá bez predpisu. Niektoré sa za opakovanej gynekologickej problém doslova hanbia, a tak, miesto návštevy lekára, si navzájom radia a skúšajú plejádu volne dostupných liečív. Čo si o tom myslíte? Chápem, že pri opakovanych problémoch sú ženy frustrované, ale v prípade výšie uvedených fažkostí je skrátka nutné vyhľadať gynekologa. Je potrebné vykonať vaginálne vyšetrenie v gynekologickej

zrkadlách, posúdenie stavu pošvy a krčku, prítomnosti výtoku, ktorý môže byť viditeľný len v okolí krčku a v pošve, ďalej je potrebné posúdenie charakteru výtoku, vykonanie testu pH, even-tuálne vyšetrenia vzorky výtoku z pošvy mikroskopicky (v prípade bakteriálnej vaginózy). Okrem toho volne dostupná liečba je symptomatická. To znamená, že môže viesť k dočasnej úľave symptomov, ale v prípade pravej infekcie k riešeniu príčiny problému nevedie. Nesprávna diagnostika a samoliečba, napríklad opakovane podávanie antimykotik pri kvasinke, na ktorú liečivo nemá vplyv, môže viesť k opačnému efektu. Pacientky potom vidia, že to vedie len k predĺženiu doby do správnej diagnostiky a liečby, a teda aj k predĺženiu bolesti a diskomfortu.

Nakoniec do ambulancie prídu, no v ešte horšom stave, ktorému sa mohli vyhnúť.

A čo v prípade bylin a rád, ktorým sa pripisuje prílastok „od starých materí“? Lebo ďalší fakt, ktorý som na diskusných fóroch spozorovala je, že mnoho žien spolieha na rôzne sedavé kúpele z bylin, aj aplikáciu tea tree oleja do pošvy, cesnaku, jogurtu, či konzumáciu oregánového oleja.

Žiaľ, liečba rastlinnými výluhmi a prípravkami v prípade aktívnej infekcie nepomôže. Môže však poslúžiť ako doplnková liečba. Herbalné prípravky majú pomocný charakter napríklad pri niektorých chronických ochoreniach ako napríklad hemoroidy, pri kožných ochoreniach ako ekzém, psoriáza, ale opakujem, nie sú riešením gynekologickej zápalov. V prípade cesnaku a jogurtu poviem len toľko, že patria do kuchyne.

Ak sa teda už stalo, že zdanivo neškodený zápal prerástol v chronický a spôsobil žene fažkosti s plodnosťou, existujú ne-

zrkadlach, posúdenie stavu pošvy a krčku,

pritomnosti výtoku, ktorý môže

byť viditeľný len v okolí krčku a v pošve, ďalej je potrebné posúdenie charakteru výtoku, vykonanie testu pH, even-tuálne vyšetrenia vzorky výtoku z pošvy mikroskopicky (v prípade bakteriálnej vaginózy). Okrem toho volne dostupná liečba je symptomatická. To znamená, že môže viesť k dočasnej úľave symptomov, ale v prípade pravej infekcie k riešeniu príčiny problému nevedie. Nesprávna diagnostika a samoliečba, napríklad opakovane podávanie antimykotik pri kvasinke, na ktorú liečivo nemá vplyv, môže viesť k opačnému efektu. Pacientky potom vidia, že to vedie len k predĺženiu doby do správnej diagnostiky a liečby, a teda aj k predĺženiu bolesti a diskomfortu.

Nakoniec do ambulancie prídu, no v ešte horšom stave, ktorému sa mohli vyhnúť.

jaké možnosti ako

takto zapríčinenú neplodnosť liečiť?

Áno. Aj odvetvie gynekológie, urológie a asistovanej reprodukcie napreduje, v súčasnosti existujú dokonca viaceré možnosti ako tieto závažné problémy riešiť. Prvým krokom je posúdenie „rozsahu škôd“. Hovoríme nadnesene o vstupnom vyšetrení a predovšetkým o posúdení stavu vajíčkovodov, ktoré môžu byť vplyvom chlamídiovej infekcie alebo rozsiahleho bakteriálneho zápalu malej panvy nepriechodné. V takom prípade existujú už overené metódy IVF, ktoré pomôžu dosiahnuť tehotnosť aj bez „pomoci“ vajcovodov.

Čo nejaké operačné zákroky pre ich znova spríechodnenie?

Existuje aj niečo také ako reoperácia zrastených vajcovodov, ale neodporúča sa. Žiaľ, má minimálny a predovšetkým vratný efekt.

Otázka na záver - patrí k partnerskému životu a preto sa o ňu zaujímajú ženy aj muži. Môže byť gynekologický zápal u ženy prenosný aj na muža? Vyžadujú si tieto ženské problémy určité kroky aj u partnera?

Áno, môže. Určite to platí v prípade chlamídii. Partnera odporúčam preliečiť mastou aj v prípade mykózy. Pri opakovom výskute je nutná systémová liečba, senzibilizácia. Podobne aj pri ureaplasmách, mykoplasmách platí, že treba preliečiť oboch. Neplatí to však pri bakteriálnej vaginóze, ktorá je záležitosťou dysmikróbie u ženy. Partner sa v tomto prípade preliečovať nemusí. Ostatné STD, čiže pohlavné prenosné choroby syfilis, kvapavka, samozrejme, je nutné preliečiť u oboch partnerov.

